

HƯỚNG DẪN

Về việc phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi và Lở mồm long móng trên đàn gia súc

Hiện nay, bệnh dịch tả lợn Châu Phi và Lở mồm long móng trên đàn gia súc đang diễn biến rất phức tạp, nếu không chủ động phòng, chống nguy cơ lây lan cao, ảnh hưởng đến chăn nuôi của người dân; để chủ động phòng chống dịch bệnh, Phòng Kinh tế hướng dẫn các thôn, người chăn nuôi, người buôn bán và Nhân dân các biện pháp phòng, chống bệnh dịch tả lợn Châu Phi và Lở mồm long móng trên đàn gia súc, cụ thể như sau:

1. Bệnh dịch tả lợn Châu Phi

1.1. Biện pháp phòng bệnh

- Không dấu dịch (thông báo với chính quyền và cơ quan chuyên môn khi phát hiện lợn nghi mắc bệnh Dịch tả lợn châu phi).
- Không mua con giống từ vùng có dịch bệnh về nuôi.
- Không đi vào vùng có thông báo bệnh dịch tả lợn châu phi.
- Không sử dụng nước rác để chăn nuôi.
- Không để các hộ tê lô vào trong chuồng bắt lợn. Khi xuất bán chủ hộ cần lựa lợn ra khỏi chuồng bắt ngoài chuồng nuôi, phun tiêu độc khử trùng dụng cụ, phương tiện người đến bắt lợn.
- Hộ chăn nuôi lợn cần tự chủ đối với sản phẩm thịt lợn. Nếu mua cần chọn sản phẩm rõ nguồn gốc, có dấu kiểm soát giết mổ, nước rửa thịt, xương lợn không đổ ra ngoài môi trường.
- Chuồng chăn nuôi lợn cần được rào, chắn không để gà, vịt, chó...vào trong khu vực chuồng nuôi mang mầm bệnh vào.
- Thực hiện rửa tay bằng xà phòng, thay đồ bảo hộ, đi ủng dẫm qua chậu hóa chất hoặc vôi trước khi vào chuồng chăm sóc lợn. Định kỳ rắc vôi, phun hóa chất tiêu độc chuồng trại tuần 1 lần.
- Thực hiện phun tiêu độc khử trùng phía bên ngoài bao cám, để khô trước khi đưa vào kho cất.

1.2. Biện pháp chống dịch

- Khi có lợn ốm điều trị không khỏi, chết không rõ nguyên nhân cần báo kịp thời cho Thôn trưởng và Thôn trưởng báo về Phòng Kinh tế (qua đồng chí Lê Thị Thanh Tâm hoặc Nguyễn Thị Lệ - Chuyên viên Phòng).

- Cách ly lợn ốm ra khu vực chuồng riêng với lợn khỏe.
- Thực hiện rửa tay bằng xà phòng, thay đồ bảo hộ, đi ủng dẫm qua chậu hóa chất hoặc vôi trước khi vào chuồng chăm sóc lợn, rắc vôi, phun hóa chất tiêu độc khử trùng toàn bộ chuồng trại, khu vực xung quanh ngày 1 lần.

2. Bệnh Lở mồm long móng

2.1. Nguyên nhân gây bệnh LMLM gia súc

- Bệnh LMLM ở gia súc là bệnh truyền nhiễm, lây lan nhanh, gây ra bởi 1 trong 7 type vi rút: Type A, O, C, Asial, SAT1, SAT2, SAT3, với hơn 60 phân type. Bệnh LMLM lây lan qua đường tiếp xúc giữa động vật khỏe với động vật, sản phẩm động vật, thức ăn, nước uống, không khí, chất thải, dụng cụ, phương tiện vận chuyển, có mang mầm bệnh. Bệnh lây lan từ vùng này sang vùng khác, tỉnh này sang tỉnh khác, nước này sang nước khác theo đường vận chuyển động vật, sản phẩm động vật ở dạng tươi sống (kể cả thịt ướp đông, da, xương, sừng, móng, sữa, lông....). Động vật mắc bệnh LMLM là các loài động vật có móng guốc chẵn như: trâu, bò, lợn, dê, cừu, hươu, nai,...

2.2. Triệu chứng bệnh LMLM gia súc

- Bệnh LMLM có thời gian ủ bệnh ngắn (từ 02 đến 07 ngày). Khi phát bệnh, vi rút tấn công mạnh vào niêm mạc miệng và da vùng móng chân của gia súc (trâu, bò, hươu, lợn, dê, cừu).

- Triệu chứng điển hình là sốt: Vật nuôi sốt từ 40⁰ C- 41⁰ C, ủ rũ, mệt mỏi, sưng mí mắt, bỏ ăn hoặc ăn ít.

- Chảy nước bọt: Gia súc chảy nhiều nước bọt quanh miệng, nước bọt màu trắng đục như bọt xà phòng. Vật nuôi có biểu hiện nghiến răng, nhai tóp tép do đau miệng.

- Xuất hiện mụn nước ở miệng: các mụn nước đỏ, mọng nước xuất hiện ở lợi, niêm mạc lưỡi, môi và mũi. Mụn nước rất dễ vỡ tạo thành các vết loét đỏ, cản trở việc ăn uống.

- Tổn thương ở vùng móng chân: Mụn nước mọc ở các kẽ ngón chân, vành móng. Khi mụn vỡ làm chân sưng đau, vật nuôi đi đứng khập khiễng, thường nằm một chỗ, trường hợp nặng có thể gây long móng (sút móng).

- Sau khi phát bệnh 10 - 15 ngày, con vật có thể khỏi về triệu chứng lâm sàng nhưng mầm bệnh vẫn tồn tại trong con vật và thải mầm bệnh ra môi trường làm phát sinh và lây lan dịch bệnh.

2.3. Phòng bệnh Lở mồm long móng

Bệnh LMLM phòng bằng các biện pháp vệ sinh phòng dịch, kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật, tiêm phòng vắc xin.

- Tăng cường công tác tuyên truyền để mọi người hiểu biết về nguyên nhân, triệu chứng, tác hại và cách phòng, chống bệnh LMLM. Thực hiện

tiêm phòng vắc xin LMLM cho gia súc hai lần trong một năm, lần thứ nhất cách lần thứ hai 6 tháng, lần thứ nhất nên tiêm vào tháng 3 - 4 trong năm, lần thứ hai nên tiêm vào tháng 9 - 10 trong năm.

- Người chăn nuôi gia súc cam kết thực hiện “5 không”: không đầu dịch; không mua gia súc, sản phẩm gia súc mắc bệnh; không bán chạy gia súc mắc bệnh; không thả rông gia súc, không vận chuyển gia súc bị bệnh ra khỏi vùng dịch; không vứt xác gia súc bừa bãi ra môi trường.

- Cách ly triệt để gia súc ốm, không cho chăn thả tập trung; thường xuyên thực hiện vệ sinh chuồng trại, bãi chăn thả, dụng cụ chăn nuôi, phương tiện vận chuyển, diệt loài gặm nhấm,... thực hiện tiêu độc, khử trùng khu vực có gia súc bị ốm, chết.

- Con giống đưa vào chăn nuôi phải khoẻ mạnh, có nguồn gốc rõ ràng, đã được tiêm phòng LMLM; trước khi nhập đàn phải được nuôi cách ly 21 ngày. Thức ăn, nước uống dùng trong chăn nuôi phải đảm bảo tiêu chuẩn vệ sinh thú y. Người vào thăm quan, nhân viên thú y,... trước khi ra, vào khu vực chăn nuôi phải phải được vệ sinh, khử trùng và trang bị bảo hộ.

2.4. Điều trị triệu chứng bệnh LMLM gia súc

Vì rút LMLM dễ bị tiêu diệt bởi ánh nắng mặt trời, nhiệt độ cao (như nước đun sôi 100⁰C), các chất có độ toan cao như chanh chua hoặc khế chua và các chất kiềm mạnh như xút. Vì rút có thể sống nhiều ngày trong chất thải hữu cơ ở chuồng nuôi, các chất có độ kiềm nhẹ (pH từ 7,2 - 7,8); trong thịt ướp đông vì rút có thể sống trong nhiều tháng.

- Khi bị nhiễm bệnh LMLM, nếu không được điều trị kịp thời, gia súc non thường bị chết ở tỷ lệ từ 20 - 50%, gia súc trưởng thành thường bị chết từ 2- 5%, tỷ lệ mắc bệnh trong một đàn thường là 100%. Đến nay, bệnh LMLM chưa có thuốc chữa trị đặc hiệu, chỉ có thuốc chữa triệu chứng. Chữa triệu chứng nhằm làm cho vết thương nhanh chóng lành thành sẹo và không gây ra các biến chứng nguy hiểm làm chết gia súc.

- Cách ly vật nuôi bị ốm, dùng thuốc hạ sốt, giảm đau, trợ tim cho vật nuôi như: Gluconat KC, Diclofenac, Cafein...Tiếp đến dùng kháng sinh để phòng bệnh kế phát.

- Dùng các thuốc sát trùng như cồn iod, xanh metylen để rửa các mụn loét ở chân, miệng, vú của gia súc.

- Đảm bảo giữ chuồng trại khô ráo, sạch sẽ, cho gia súc ăn uống đủ dinh dưỡng nhằm nâng cao sức đề kháng.

- Cùng với việc điều trị bệnh, cần tiến hành tiêu độc khử trùng chuồng trại, môi trường xung quanh khu vực có gia súc bị bệnh và các vật dụng có liên quan đến gia súc ốm, chết; thực hiện nuôi nhốt, cách ly gia súc.... theo hướng dẫn của cán bộ thú y.

Trên đây là hướng dẫn phòng, chống bệnh dịch tả lợn Châu Phi và Lở mồm long móng trên đàn gia súc, Phòng Kinh tế đề nghị các thôn thông báo rộng rãi, tuyên truyền và hướng dẫn Nhân dân thực hiện nghiêm túc./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch, các PCT UBND xã;
- Lưu: KT.



TRƯỞNG PHÒNG

Thiều Chung Nghĩa